


LA TRANSMISSION DE LA VIE CHEZ LES HUMAINS

La maîtrise des naissances


- **1 - De la naissance subie à la naissance choisie**
- En France, jusqu'en 1950 environ, les naissances étaient subies: les enfants étaient nombreux, pas toujours voulus et la mortalité des mères, après accouchement, assez élevée.
- Des comportements comme l'infanticide et surtout l'avortement clandestin étaient fréquents.
- La compréhension des mécanismes de la reproduction et l'évolution des moeurs (féminisme) ont permis de **choisir** les naissances.

- **2 - La contraception utilise plusieurs méthodes**
- contraception = ensemble des méthodes réversibles ayant pour but d'empêcher une grossesse en cas de rapport sexuel
- A - la "pilule" met les ovaires au repos
- “La” pilule apporte régulièrement à l'organisme des hormones qui bloquent l'ovulation: la grossesse devient alors impossible.

*Apport d'hormones
ovariennes*



*Apport d'hormones
ovariennes*




- C'est un traitement médical de 21 jours, qui s'arrête 7 jours ou se produisent de "fausses règles" pendant 2 jours, puis reprend.



- Chaque pilule doit être prise à heure fixe chaque jour. A cette condition, elle est **extrêmement efficace**.
- *Elle est disponible gratuitement dans les centres de planning familial, et éventuellement au niveau des médecins et infirmières scolaires.*

- Il existe des implants fonctionnant comme la pilule et qui, placés sous la peau, restent actifs quelques années.




- **B - le préservatif empêche le contact des gamètes**
- Cette gaine de latex placée avant pénétration sur le pénis en érection empêche les spz de rentrer dans le vagin, la fécondation est donc impossible.
- Convenablement utilisé, ce procédé est efficace mais parfois lourd à gérer !




la contraception





- **C - le stérilet tue les spz et empêche la nidation**
- Le stérilet est un objet en forme de T mis en place dans l'utérus (par un médecin). L'utérus réagit à cette présence en empêchant la fixation d'un embryon éventuel.
- Ce procédé est un peu moins efficace que les autres.
-



- **D - la contraception d'urgence**

- Après un rapport sexuel non (ou mal) protégé, la prévention d'une grossesse s'effectue par la prise d'une **contraception d'urgence** sous contrôle médical
- Elle n'est efficace que pendant quelques jours après le rapport.



- **3 - Certaines méthodes contraceptives protègent des infections sexuellement transmissibles (IST).**
- Les microbes causant des IST se transmettant par contact entre pénis et vagin, d'isoler ces organes suffit pour empêcher les infections.
- C'est l'avantage des préservatifs masculins (faciles à mettre en place) ou féminins (d'emploi plus délicat).
- Une bonne hygiène diminue aussi fortement les risques d'infections !



Les MST se manifestent par des indices (symptômes) variés:

- brûlures en urinant*
- pertes blanches malodorantes (particulièrement chez les femmes)*
- éruption de boutons, démangeaisons.*

Il ne faut pas hésiter à signaler ces indices à un médecin ou une infirmière, car la plupart des MST se soignent très bien si elles sont détectées suffisamment tôt.

Une seule reste actuellement mortelle: le SIDA.