

LA TRANSMISSION DE LA VIE CHEZ LES HUMAINS

La maîtrise des naissances

- **1 - De la naissance subie à la naissance choisie**

- **1 - De la naissance subie à la naissance choisie**
- En France, jusqu'en 1950 environ, les naissances étaient subies: les enfants étaient nombreux, pas toujours voulus et la mortalité des mères, après accouchement, assez élevée.

- **1 - De la naissance subie à la naissance choisie**
- En France, jusqu'en 1950 environ, les naissances étaient subies: les enfants étaient nombreux, pas toujours voulus et la mortalité des mères, après accouchement, assez élevée.
- Des comportements comme l'infanticide et surtout l'avortement clandestin étaient fréquents.

- **1 - De la naissance subie à la naissance choisie**
- En France, jusqu'en 1950 environ, les naissances étaient subies: les enfants étaient nombreux, pas toujours voulus et la mortalité des mères, après accouchement, assez élevée.
- Des comportements comme l'infanticide et surtout l'avortement clandestin étaient fréquents.
- La compréhension des mécanismes de la reproduction et l'évolution des mœurs (féminisme) ont permis de **choisir** les naissances.



- **2 - La contraception utilise plusieurs méthodes**




- **2 - La contraception utilise plusieurs méthodes**
- contraception = ensemble des méthodes ayant pour but d'empêcher une grossesse en cas de rapport sexuel



- **2 - La contraception utilise plusieurs méthodes**
- contraception = ensemble des méthodes ayant pour but d'empêcher une grossesse en cas de rapport sexuel
- 21 - la "pilule" met les ovaires au repos



- **2 - La contraception utilise plusieurs méthodes**
- contraception = ensemble des méthodes ayant pour but d'empêcher une grossesse en cas de rapport sexuel
- 21 - la "pilule" met les ovaires au repos
- “La” pilule apporte régulièrement à l'organisme des hormones qui bloquent l'ovulation: la grossesse devient alors impossible.



- C'est un traitement médical de 21 jours, qui s'arrête 7 jours ou se produisent de "fausses règles" pendant 2 jours, puis reprend.

- C'est un traitement médical de 21 jours, qui s'arrête 7 jours ou se produisent de "fausses règles" pendant 2 jours, puis reprend.
- Chaque pilule doit être prise à heure fixe chaque jour. A cette condition, elle est **extrêmement efficace**.

- C'est un traitement médical de 21 jours, qui s'arrête 7 jours ou se produisent de "fausses règles" pendant 2 jours, puis reprend.
- Chaque pilule doit être prise à heure fixe chaque jour. A cette condition, elle est **extrêmement efficace**.
- *Elle est disponible gratuitement dans les centres de planning familial, et éventuellement au niveau des médecins et infirmières scolaires.*

- C'est un traitement médical de 21 jours, qui s'arrête 7 jours ou se produisent de "fausses règles" pendant 2 jours, puis reprend.




- Chaque pilule doit être prise à heure fixe chaque jour. A cette condition, elle est **extrêmement efficace**.
- *Elle est disponible gratuitement dans les centres de planning familial, et éventuellement au niveau des médecins et infirmières scolaires.*

- **22 - le préservatif empêche le contact des gamètes**


- **22 - le préservatif empêche le contact des gamètes**
- Cette gaine de latex placée avant pénétration sur le pénis en érection empêche les spz de rentrer dans le vagin, la fécondation est donc impossible.

- **22 - le préservatif empêche le contact des gamètes**
- Cette gaine de latex placée avant pénétration sur le pénis en érection empêche les spz de rentrer dans le vagin, la fécondation est donc impossible.
- Convenablement utilisé, ce procédé est efficace mais parfois lourd à gérer !


- **22 - le préservatif empêche le contact des gamètes**
- Cette gaine de latex placée avant pénétration sur le pénis en érection empêche les spz de rentrer dans le vagin, la fécondation est donc impossible.
- Convenablement utilisé, ce procédé est efficace mais parfois lourd à gérer !
- *act: mettre (et enlever) un préservatif*




- **23 - le stérilet empêche la nidation**



- **23 - le stérilet empêche la nidation**
- Le stérilet est un objet en forme de T mis en place dans l'utérus (par un médecin). L'utérus réagit à cette présence en empêchant la fixation d'un embryon éventuel.



- **23 - le stérilet empêche la nidation**
- Le stérilet est un objet en forme de T mis en place dans l'utérus (par un médecin). L'utérus réagit à cette présence en empêchant la fixation d'un embryon éventuel.
- Ce procédé assez peu efficace n'est utilisé que chez des femmes ayant déjà eu des enfants, car il peut faciliter des infections des trompes.



- **24 - la contraception d'urgence**
- Après un rapport sexuel non (ou mal) protégé, la prévention d'une grossesse s'effectue par la prise d'une **contraception d'urgence** sous contrôle médical
- Elle n'est efficace que pendant quelques jours après le rapport.

- **3 - Certaines méthodes contraceptives protègent des maladies sexuellement transmissibles (MST).**

- **3 - Certaines méthodes contraceptives protègent des maladies sexuellement transmissibles (MST).**
- Comme les germes responsables des MST se transmettent par contact entre pénis et vagin, il suffit d'isoler ces organes pour empêcher les infections.

- **3 - Certaines méthodes contraceptives protègent des maladies sexuellement transmissibles (MST).**
- Comme les germes responsables des MST se transmettent par contact entre pénis et vagin, il suffit d'isoler ces organes pour empêcher les infections.
- C'est l'avantage des préservatifs masculins (faciles à mettre en place) ou féminins (d'emploi plus délicat).

- **3 - Certaines méthodes contraceptives protègent des maladies sexuellement transmissibles (MST).**
- Comme les germes responsables des MST se transmettent par contact entre pénis et vagin, il suffit d'isoler ces organes pour empêcher les infections.
- C'est l'avantage des préservatifs masculins (faciles à mettre en place) ou féminins (d'emploi plus délicat).
- Une bonne hygiène diminue aussi fortement les risques d'infections !

Les MST se manifestent par des indices (symptômes) variés:

Les MST se manifestent par des indices (symptômes) variés:

- brûlures en urinant

Les MST se manifestent par des indices (symptômes) variés:

- brûlures en urinant*
- pertes blanches malodorantes (particulièrement chez les femmes)*

Les MST se manifestent par des indices (symptômes) variés:

- brûlures en urinant*
- pertes blanches malodorantes (particulièrement chez les femmes)*
- éruption de boutons, démangeaisons.*

Les MST se manifestent par des indices (symptômes) variés:

- brûlures en urinant*
- pertes blanches malodorantes (particulièrement chez les femmes)*
- éruption de boutons, démangeaisons.*

Il ne faut pas hésiter à signaler ces indices à un médecin ou une infirmière, car la plupart des MST se soignent très bien si elles sont détectées suffisamment tôt.

Les MST se manifestent par des indices (symptômes) variés:

- brûlures en urinant*
- pertes blanches malodorantes (particulièrement chez les femmes)*
- éruption de boutons, démangeaisons.*

Il ne faut pas hésiter à signaler ces indices à un médecin ou une infirmière, car la plupart des MST se soignent très bien si elles sont détectées suffisamment tôt.

Une seule reste actuellement mortelle: le SIDA.